

CONDUITE A TENIR

lors d'un Accident d'Exposition au Sang (AES)

AFFICHER la procédure dans le cabinet

ARLIN Rhône-Alpes Décembre 2015

Situations CAT	Piqûre, coupure, contact direct du liquide biologique contenant du sang* sur peau lésée	Projection sur muqueuse et yeux
<p>1 Premiers soins à faire d'urgence</p>	<p>Si possible arrêter le soin immédiatement Ne pas faire saigner. Lavage de la zone avec de l'eau et du savon puis rinçage. Antiseptie pendant au moins 5 minutes avec Dakin® ou Bétadine® (polyvidone iodée solution dermique) ou à défaut alcool à 70°.</p> 	<p>Si besoin, retirer les lentilles de contact. Rincer abondamment à l'eau ou au sérum physiologique pendant au moins 5 minutes.</p> 
<p>2 Evaluer le risque infectieux du patient source</p>	<p>Consentement du patient pour prélèvement des sérologies. (VIH, hépatites B et C) +/- Test Rapide d'Orientation Diagnostique du VIH (TROD)</p>	
<p>3 Contacter le référent médical hospitalier dans les 4 heures</p>	<p>Avis pris auprès d'un médecin référent pour la prophylaxie (infectiologue) ou du médecin des urgences de l'établissement le plus proche, permettant de discuter l'intérêt d'une chimioprophylaxie en fonction du statut du patient source et du type d'AES.</p>	
<p>4 Déclaration de l'accident</p>	<p>Dans les 24 à 48 heures auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, d'une mutuelle ou d'une compagnie d'assurance privée (assurance pour le risque d'accident du travail).</p>	